



# Desnutrición Aguda en menor de 5 años (2019-2020)




Mapa de riesgo de la incidencia por desnutrición aguda en menores de 5 años. Antioquia 2019 n: 1.401 casos.



**Tasa en Antioquia**  
305,9 casos/cien mil niños menores de 5 años.



Distribución porcentual de los casos de desnutrición aguda por subregión de residencia. Primer trimestre-Antioquia 2020.



Primer trimestre 2019

413 casos

Primer trimestre 2020

321 casos


## Distribución porcentual de los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años



NIÑOS

55,1%


44,9%



NIÑAS

## Mortalidad por desnutrición en Antioquia 2015-2019

Tendencia de la mortalidad por desnutrición. Antioquia 2015-2019



Tasa Antioquia 2019

2,2 casos/cien mil niños menores de 5 años

Tasa Colombia 2019


6,83 casos/cien mil niños menores de 5 años

Defunciones por desnutrición en menores de cinco años, por subregión. Primer trimestre.


SUBREGIONES	2019		2020	
	Nº	%	Nº	%
BAJO CAUCA	0	0,0	1	25,0
MAGDALENA MEDIO	0	0,0	0	0,0
NORDESTE	0	0,0	0	0,0
NORTE	0	0,0	0	0,0
OCCIDENTE	0	0,0	0	0,0
ORIENTE	0	0,0	0	0,0
SUROESTE	0	0,0	1	25,0
URABÁ	2	100,0	1	25,0
VALLE DE ABURRÁ	0	0,0	1	25,0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

Fuente: Primer trimestre 2019 DANE; 2020 RUAF-ND con corte a 18/05/2020  
NOTA: Para el año 2020 son las defunciones que reportan el evento en alguna de las causas relacionadas.

## Mortalidad por desnutrición en menor de 5 años. Antioquia 2019. n=10



Mortalidad por desnutrición por sexo. Antioquia primer trimestre 2019-2020



## ¿Cómo prevenir la desnutrición?

- La lactancia materna exclusiva y a libre demanda, es la seguridad alimentaria y nutricional en los primeros 6 meses de vida, porque tiene las calorías y los nutrientes suficientes, inocuos y necesarios para salud y la nutrición de los lactantes menores.
- La alimentación complementaria basada en carnes, cereales, frutas y verduras, acompañado de lactancia materna después de los 6 meses de vida, garantiza el buen estado de salud y nutrición en los primeros 5 años de vida.
- Asistir al control de crecimiento y desarrollo, ayuda a la identificación oportuna de alteraciones del estado nutricional y la intervención oportuna de los mismos.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS