Conducta suicida en Antioquia (2019-2020)



Mapa de riesgo **intento de suicidio** Antioquia 2019 **n= 5373.**



Tasa Antioquia 2019	Tasa Colombia
82,0 casos por cien mil habitantes	**60,6 casos** por cien mil habitantes

Incidencia de intento de suicidio, **según subregión de ocurrencia-**Antioquia, primer trimestre 2020.



	Valle de Aburrá	Oriente	Suroeste	Urabá	Norte	Occidente	Nordeste	Bajo Cauca	Magdalena Medio
%Porcentaje	65,9	12	5,4	4,8	4,1	4,1	1,7	1,4	0,6

Comparativo por semana epidemiológica primer trimestre 2019-2020

Primer trimestre 2019	Primer trimestre 2020
1372 casos	1426 casos

Distribución porcentual del intento de suicidio por grupos de edad. Primer trimestre 2020

EDAD	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 y más
CASOS	8	523	489	212	119	49	15	6	5
%	0,6%	36,7%	34,3%	14,9%	8,3%	3,4%	1,1%	0,4%	0,4%

Distribución porcentual del intento de suicidio, por sexo. Primer trimestre de 2020

HOMBRE

506 casos

35,5%

920 casos

64,5%

MUJER

Suicidio en Antioquia 2019

Tendencia de la mortalidad por suicidio. Antioquia 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
Muertes	374	400	392	434	449
Tasa por cien mil mujeres	5,8	6,1	5,9	6,8	6,9

Tasa Antioquia 2019	Tasa Colombia 2018
6,9 Casos/cien mil habitantes	**5,76 casos**/cien mil habitantes

Suicidios por subregión de procedencia. Primer trimestre 2019-2020

SUBREGIONES	2019		2020	
	N°	%	N°	%
BAJO CAUCA	3	2,6	1	0,8
MAGDALENA MEDIO	2	1,7	3	2,5
NORDESTE	0	0,0	4	3,3
NORTE	5	4,3	3	2,5
OCCIDENTE	2	1,7	1	0,8
ORIENTE	12	10,3	22	18,2
SUROESTE	5	4,3	7	5,8
URABÁ	7	6,0	7	5,8
VALLE DE ABURRÁ	81	69,2	13	60,3
TOTAL	**117**	**100**	**121**	**100**

Fuente: Primer trimestre 2019 DANE; 2020 RUAF-ND con corte a 18/05/2020
NOTA: Para el año 2020 son las defunciones que reportan el evento en el capitulo 4 del certificado de defunción.

Distribución porcentual del intento de suicidio según mecanismo utilizado.



1053 casos	248 casos	81 casos	55 casos
73,3%	17,3%	5,6%	3,8%

Suicidios por grupos de edad y sexo, Antioquia primer trimestre 2019-2020



Factores de riesgo de suicidio

- Intento de suicidio previo.
- Desordenes mentales.
- Antecedentes familiares de suicidio.
- Uso nocivo de alcohol.
- Desesperación.
- Dolor crónico.
- Pérdida laboral o financiera.
- Factores genéticos y biológicos.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS