
Morbilidad Materna Extrema - MME (2019-2020)




Mapa de riesgo de **morbilidad materna extrema**. Antioquia 2019 **n= 1727 casos.**




23,7 Casos/cien

PORG

36,5 casos/cien



Distribución porcentual de los casos de MME por subregión de residencia.



Primer trimestre 2019
432 casos




Comportamiento de la morbilidad materna extrema. Antioquia primer trimestre 2020

Distribución porcentual de los casos de MME según edad de la materna

| EDAD | 1 0 a 19 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | Total |
|----------|-----------------|---------|---------|---------|-------|
| CASOS | 77 | 280 | 180 | 24 | 560 |
| RCENTAJE | 14% | 50% | 32% | 4% | 100% |

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad



Mortalidad materna por causas directas. Antioquia 2019



Tasa Antioquia 2019 23,7 Casos/cien mil

nacidos vivos

Tasa Colombia 2019

13,59 casos/ cien mil



¿Qué factores influyen en la morbilidad materna extrema?

Son diferentes los factores que pueden influir en este desenlace:

Eclampsia: presencia de una o más convulsiones generalizadas, estado de coma o ambos, en el contexto de la preeclampsia.

Falla cardíaca: paro cardíaco.

necesidad de soporte ventilatorio.

Falla hepática: corresponde a una alteración en la función hepática, la cual puede manifestarse por ictericia en la piel

puede manifestarse por ictericia en la piel.

Falla respiratoria: síndrome de dificultad para respirar en la cual existe la

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS