

Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años



Año

▼

2025

▼

Periodo

▼

Periodo 1

▼

Semana

▼

Selección múlt...

▼

Municipio

▼

Todas

▼

Subregión

▼

Todas

▼

DESNUTRICION DB

INDICADORES

Casos

37

Prevalencia Total

0,01

Urbana


23

62,16 %

Rural

14

37,84 %



SEXO

Mujeres

18

Hombres

19

Promedio Edad en Meses

22,6








Tabla de Frecuencia de la Pertenencia Étnica		
Pertenencia Étnica	Nº de Casos	%
Otro	35	94,59%
Indígena	2	5,41%
Total	37	100,00%



Casos de desnutrición por EAPB			
Aseguradora	Contributivo	Subsidiado	Total
SURA EPS	7	2	9
SAVIA SALUD	1	9	10
SANITAS EPS	1		1
SALUD TOTAL	2		2
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO		4	4
NUEVA EPS	5		5
COOSALUD ESS EPS-S		4	4
ASMET SALUD ESS		1	1
ALIANSA SALUD EPS		1	1
Total	16	21	37



Total de casos
37



Crecimiento y Desarrollo

76 %



38

Semanas



11



2.853

grm



5,46

Meses



11 %

0
ASOS

0,0 %

PRIORIZACIÓN		
▲	PRIORIZACIÓN	CASOS
1.	Super urgentes indig	2
2.	Super urgentes no indig	18

Kategorie	Anteil
Keine Grippe	75,68%
Grippe	24,32%



Frequency	Percentage
Often	81.0%
Sometimes	17.9%
Never	1.1%

TIP

- Moderada
- Severa

● S

A donut chart showing the distribution of responses for the statement "The company is not doing enough to protect the environment". The chart is divided into six segments with the following percentages: 16.67% (blue), 11.9% (dark blue), 9.52% (purple), 7.14% (pink), 4.76% (dark purple), and 7.14% (orange).

Response	Percentage
Strongly agree	16.67%
Agree	11.9%
Neutral	9.52%
Disagree	7.14%
Strongly disagree	4.76%
Don't know	7.14%

1

- Totalcabello
- Totaldelgado

- Totalpiel
- TotalEDEM


- Totalpalide

● Número de Casos ● Prevalencia Antioquia ● Prevalencia COLOMBIA

Meta nacional: 0.9%
Meta ODS: menos de 0.5%

Año	Nº de Casos	Prevalencia Antioquia	Prevalencia COLOMBIA
2018	1326	0.29	0.38
2019	1393	0.30	0.44
2020	711	0.16	0.27
2021	1409	0.31	0.41
2022	2246	0.51	0.56
2023	2253	0.52	0.65
2024	2845	0.67	0.49
2025	37	0.37	0.67

CANAL ENDÉMICO 2018 - 2025



Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
1	26	23	● ESTABLE
2	22	14	↓ DECREMENTO

Subregion	Casos	Prevalencia
Urabá	1	0,002
Valle de Aburrá	13	0,006
Oriente	4	0,009
Nordeste	2	0,013
Suroeste	3	0,013

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA - a **semana 2 de 2025**. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población **DANE 2025**.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a **2025** hasta semana epidemiológica **2**.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWVR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que esperado y lo observado, con un valor de significancia de .menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el **2025**.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (prétermo, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.