


Fecha última actualización:
10/12/2026

Comportamiento epidemiológico de la Desnutrición aAguda en Niños y Niñas Menores de Cinco (5) Años. semana epidemiológica 52




Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años.
Semana epidemiológica 52

Desnutrición

Indicadores

Indicadores críticos





Reincidentes	
Casos	Porcentaje de reincidentes
768	30,5 %

Prevalencia por municipio de residencia	
Municipio	Prevalencia
MUJERDÍO	1,47
TOLUCA	1,42
NECOLI	1,21
VILLA DEL FUERTE	1,15
GÓMEZ PLATA	1,10
GUATAPÉ	1,08
EL TINTAL	1,07
SONSON	1,08
TURBO	1,08
AMALFI	1,00
ANGOSTURA	0,99
URIBEROCAZ	0,97
CISNEROS	0,94
FRONTERA	0,92
COCORNA	0,92
MILAN	0,91
MACEO	0,89
SAN JUAN DE URABA	0,88
VALDIVIA	0,65
CARPÉA	0,62
VALÍA	0,60
CIUDAD BOLÍVAR	0,59
CÁCICA	0,58
ANZA	0,58
GRANADA	0,57
CARMANTA	0,77
TIERRA DE OL	0,79
GIRALDO	0,75
URRÁO	0,73
MEDELLÍN	0,73
ANGÉLICOPOLIS	0,73
EL TINTAL	0,72
CÁCERES	0,70
SANTUARIO	0,70
SAN JOSÉ DE LA MONTANA	0,69
CHIGORODO	0,68
EL TINTAL	0,67
TAÍNOSIS	0,67
GUARNE	0,66
SEGOVIA	0,66
BELMIRA	0,65
RETIRO	0,65
SANTAFÉ DE ANTIOQUÍA	0,64
DABEBÍA	0,63
BRICEÑO	0,63
CARMEN DE VIBORAL	0,62
CAUCA	0,62
SAN PEDRO	0,61
LA UNION	0,59
BIOMAGRO	0,58
ARGELIA	0,57

Priorización	
Priorización	CASOS
muy urgentes indígenas	10
super urgentes indígenas	35
muy urgentes no indígenas	307
super urgentes no indígenas	519
regular	1.650

Prevalencia por Subregión	
Subregión	Casos
Uraba	388
Nordeste	120
Valle de Aburrá	1280
Occidente	265
Bogotá Cauca	151
Centro	85
Norte	90
Sureste	108
Magdalena Medio	33



Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
52	20	20	ESTABLE
51	30	36	ESTABLE
50	30	47	ESTABLE
49	32	33	ESTABLE
48	33	48	ESTABLE
47	36	49	ESTABLE
46	39	35	ESTABLE
45	35	29	DECREMENTO
44	41	51	ESTABLE
43	46	48	ESTABLE
42	39	41	ESTABLE
41	52	52	ESTABLE
40	47	51	ESTABLE
39	49	64	ESTABLE
38	50	47	ESTABLE
37	41	36	ESTABLE
36	36	55	ESTABLE
35	42	55	ESTABLE
34	43	57	ESTABLE
33	47	59	ESTABLE
32	48	40	ESTABLE
31	43	46	ESTABLE
30	44	53	ESTABLE
29	32	66	ESTABLE
28	36	60	ESTABLE

Elaborado por:

Juan Camilo Betancur Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGRESS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Felipe Muñoz Toro
Practicante Excelencia Gobernación de Antioquia - EGRESS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Ficha Técnica	
Ficha técnica	Boletín de DNT.
Informo	descripción retrospectiva que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA a semana 52 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.
La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 52.	
Los comportamientos inusuales se definen mediante el modo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se uso la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arrojó la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de este manera se logra identificar en los municipios que presentan comportamientos extraños a lo que se considera normal en la población de acuerdo a la tasa de 0.05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y se notificado en el 2025.	
Las variables de interés analizadas para este evento fueron sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretermine, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de edad con perímetro braquial menor a 11.5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.	

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIVIGILA 2025.
DANE 2025