

Fecha última actualización:
23/01/2026



Comportamiento epidemiológico de la Desnutrición aAguda en Niños y Niñas Menores de Cinco (5) Años, semana epidemiológica 2




Año
Periodo
Semana
Municipio
Subregión
Limpia Filtros
Desnutrición
Indicadores

Casos
84

Prevalencia total
0,02

Urbana
65
77,38 %

Rural
19
22,62 %



SEXO


Niñas
34

%
40,48



Niños
50

%
59,52

Promedio edad en meses
30,7



Pertenencia Étnica	Nº de Casos	%
Otro	79	94,05%
Indígena	2	2,38%
Negro, mulato afro colombiano	2	2,38%
Raizal	1	1,19%
Total	84	100,00%







Aseguradora	Contributivo	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	4		20	24
NUEVA EPS	7		14	21
SURA EPS	14		3	17
SALUD TOTAL	7		2	9
COOSALUD ESS EPS-S			4	4
SANITAS EPS	3		3	6
COMFASUCRE			2	2
SIN ASEGURAMIENTO		2		2
COLSANITAS	1			1
COOSALUD			1	1
Total	36	2	46	84



Desnutrición

Indicadores

Indicadores críticos



Prevalencia por municipio de residencia






Municipio	Prevalencia
YALI	0.16
GÓMEZ PLATA	0.16
GUARNE	0.14
NEOCOLÍ	0.13
VEGACHI	0.11
RIEGOSTURA	0.10
CANASGORDAS	0.08
DABEIBA	0.08
MUTITA	0.08
SAN CARLOS	0.07
SALGAR	0.07
CIUDAD BOLÍVAR	0.07
PUERTO TRIUNFO	0.06
CHIGORRO	0.06
SANTAFÉ DE ANTIOQUIA	0.05
SAN JUAN DE URABÁ	0.04
URRÁO	0.04
ANDES	0.03
CAUCASIA	0.03
REMEDIOS	0.03
CACERES	0.03
SEGOVIA	0.03
CALDAS	0.02
MEDELLÍN	0.02
RIONEGRO	0.02
ITAGUI	0.02
CARMEN DE VIBORAL	0.02
CAREPA	0.02
ENVIGADO	0.02
BELLO	0.02
TURBIO	0.02
APIYATADO	0.01

Priorización

Priorización	Casos
super urgentes indígenas	1
muy urgentes no indígenas	5
super urgentes no indígenas	20
regular	58

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Uraba	14	0.03
Nordeste	4	0.03
Occidente	4	0.02
Valle de Aburrá	42	0.02
Oriente	9	0.02
Suroeste	4	0.02
El Valle de Cauca	4	0.01
Magdalena Medio	1	0.01
Norte	2	0.01



Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIGVILA a semana 2 de 2026. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2026.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIGVILA entre los años 2018 a 2026 hasta semana epidemiológica 2.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2026.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y al indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIGVILA.

Elaborado por:

Carolina Castañeda Vásquez
Epidemióloga vigilancia nutricional
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Camilo Betancur Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGRESIP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Felipe Muñoz Toro
Practicante Excepcional Gobernación de Antioquia - EGRESIP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIGVILA 2026,
DANE 2026