

Fecha última actualización:

jueves, 14 de mayo de 2026

Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia

Año

2026

Semana

Todas

Subregión





Todas

Municipio




Todas

Tipo Leishmaniasis

Todas



Pertenencia Étnica		
Pertenencia Étnica	Casos	%
Otro	199	95,22%
Negro, mulato afro colombiano	8	3,83%
Indígena	2	0,96%
Total	209	100,00%



Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



Año			
2023	2024	2025	2026

Número de Casos Según subregión y municipio procedencia		
subregion	Total casos	%
☐ NORDESTE	74	35,41%
ANORI	24	11,48%
REMEDIOS	20	9,57%
SEGOVIA	18	8,61%
VEGACHI	6	2,87%
AMALFI	3	1,44%
SAN ROQUE	3	1,44%
☐ URABÁ	61	29,19%
SAN PEDRO DE URABA	26	12,44%
NECOCLI	10	4,78%
TURBO	10	4,78%
SAN JUAN DE URABA	5	2,39%
APARTADO	4	1,91%
ARBOLETES	2	0,96%
CAREPA	1	0,48%
CHIGORODO	1	0,48%
MURINDO	1	0,48%
MUTATA	1	0,48%
☐ BAJO CAUCA	23	11,00%
EL BAGRE	6	2,87%
TARAZA	5	2,39%
NECHI	4	1,91%
ZARAGOZA	4	1,91%
CACERES	3	1,44%
CAUCASIA	1	0,48%
☐ ORIENTE	22	10,53%
SONSON	7	3,35%
SAN LUIS	4	1,91%
SAN FRANCISCO	3	1,44%
ABEJORRAL	2	0,96%
ARGELIA	2	0,96%
SAN CARLOS	2	0,96%
COCORNA	1	0,48%
SAN RAFAEL	1	0,48%
☐ NORTE	15	7,18%
VALDIVIA	12	5,74%
ANGOSTURA	1	0,48%
BRICENO	1	0,48%
ITUANGO	1	0,48%
☐ MAGDALENA MEDIO	8	3,83%
MACEO	3	1,44%
YONDO (CASABE)	3	1,44%
CARACOLI	1	0,48%
PUERTO BERRIO	1	0,48%
☐ OCCIDENTE	4	1,91%
BURITICA	1	0,48%
DABEIBA	1	0,48%
LIBORINA	1	0,48%
SANTAFE DE ANTIOQUIA	1	0,48%
☐ SUROESTE	1	0,48%
URRAO	1	0,48%
☐ VALLE DE ABURRÁ	1	0,48%
CALDAS	1	0,48%
Total	209	100,00%

Año	
LEISHMANIASIS CUTANEA	LEISHMANIASIS MUCOSA

Numero de casos por sexo y grupo edad		
Sexo	Casos	%
☐ Hombre	158	75,6%
0-4 años	2	1,0%
5-9 años	5	2,4%
10-14 años	10	4,8%
15-19 años	20	9,6%
20-24 años	39	18,7%
25-29 años	22	10,5%
30-34 años	11	5,3%
35-39 años	10	4,8%
40-44 años	6	2,9%
45-49 años	9	4,3%
50-54 años	7	3,3%
55-59 años	6	2,9%
60 y más años	11	5,3%
☐ Mujer	51	24,4%
0-4 años	5	2,4%
5-9 años	5	2,4%
10-14 años	4	1,9%
15-19 años	7	3,3%
20-24 años	2	1,0%
25-29 años	5	2,4%
30-34 años	5	2,4%
35-39 años	3	1,4%
40-44 años	2	1,0%
45-49 años	2	1,0%
50-54 años	6	2,9%
55-59 años	2	1,0%
60 y más años	3	1,4%
Total	209	100,0%

Incidencia de leishmaniasis cutánea por subregión en menores de 10 años. Antioquia 2023-2026. (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis cutánea en menores de 10 años				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	0,66	0,66	0,00	0,00
Urabá	10,86	6,33	6,79	1,81
Suroeste	2,13	1,42	2,13	0,71
Oriente	5,23	9,89	7,56	2,91
Occidente	18,01	20,58	3,86	0,00
Norte	18,90	20,16	7,56	2,52
Nordeste	15,96	20,21	39,36	4,26
Magdalena Medio	2,14	0,00	4,27	2,14
Bajo Cauca	0,00	1,07	3,20	0,00
Antioquia	7,61	7,99	7,61	1,58

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____ casos de leishmaniasis en menores de 10 años

Incidencia de leishmaniasis por subregión. Antioquia 2023-2026 (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis por subregión				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	11,25	11,91	13,89	0,66
Urabá	153,82	85,50	90,93	27,60
Suroeste	13,49	21,30	19,88	0,71
Oriente	53,50	94,78	100,60	12,79
Occidente	108,04	97,75	77,17	5,14
Norte	183,93	156,21	139,84	18,90
Nordeste	232,99	305,33	589,39	78,73
Magdalena Medio	72,60	89,68	96,09	17,08
Bajo Cauca	93,73	84,14	105,44	24,50
Antioquia	96,48	93,61	119,98	19,41

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____casos de leishmaniasis

Casos de leishmaniasis según ocupación. Antioquia.

Nombre ocupación	Casos	% Casos
Otros miembros de las fuerzas armadas	39	18,66%
Estudiante	37	17,70%
Hogar (ama de casa)	25	11,96%
Mineros y canteros	17	8,13%
Personas que realizan trabajos varios	17	8,13%
Agricultores de cultivos extensivos	13	6,22%
Cesante o sin ocupaciøn o desempleado	7	3,35%
No aplica	7	3,35%
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes	7	3,35%
Otros oficiales, operarios y oficios	6	2,87%
Trabajadores forestales	6	2,87%
Agricultores de huertas, invernaderos, viveros y jardines	3	1,44%
Guardias de protección	2	0,96%
Menor de edad	2	0,96%
Oficiales de las fuerzas militares	2	0,96%
Pensionado	2	0,96%
Agricultores de cultivos permanentes (plantaciones de arboles y arbustos)	1	0,48%
Ayudantes electricistas	1	0,48%
Conductores de camionetas y vehículos livianos	1	0,48%
Creadores y analistas de sistemas informaticos	1	0,48%
Electrotécnicos	1	0,48%
Operadores de maquinas de movimiento de tierras, construccion vías y afines	1	0,48%
Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines	1	0,48%
Patrulleros y agentes de policía	1	0,48%
Pegadores cargas explosivas	1	0,48%
Profesores de enseñanza secundaria	1	0,48%
Supervisores administrativos	1	0,48%
Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución	1	0,48%
Trabajadores agrícolas de subsistencia	1	0,48%
Trabajadores agropecuarios de subsistencia	1	0,48%
Trabajadores calificados de riego agrícola	1	0,48%
Vendedor de tienda	1	0,48%
Veterinarios	1	0,48%
Total	209	100,00%

¡Advertencia! Los datos del año 2025 son preliminares y pueden variar por ajustes de notificación

Fecha última actualización:

jueves, 14 de mayo
de 2026

Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Año: 2026, Semana: Todas, Subregión: Todas, Municipio: Todas, Tipo Leishmaniasis: L. Cutánea

208
Casos total leishmaniasis



100,0 %

208
Total casos L.
Cutanea

0,5 %

1
Total casos L.
Mucosa

(En blanco)

(En blanco)
Total casos L.
Visceral

Área de residencia



44

Cabecera mpal



18

Centro poblado




146

Rural dispersa



51
Mujeres


24,5 %




157
Hombres

75,5 %


N° Casos por Sexo y Curso de Vida




N° Casos por Sexo y Grupo de Edad



Estrato




Tipo de Régimen en Salud




Pertenencia Étnica

Pertenencia Étnica	Casos	%
Otro	198	95,19%
Negro, mulato afro colombiano	8	3,85%
Indígena	2	0,96%
Total	208	100,00%


Ubicación geográfica del número de casos por subregión y municipio



Ubicación geográfica del número de casos por subregión y municipio



Casos de Leishmaniasis según semana



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Anthuan Uribe Rios
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Leishmaniasis, Código 420, 430, 440.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



Año			
2023	2024	2025	2026

Número de Casos Según subregión y municipio procedencia		
subregion	Total casos	%
NORDESTE	73	35,10%
ANORI	23	11,06%
REMEDIOS	20	9,62%
SEGOVIA	18	8,65%
VEGACHI	6	2,88%
AMALFI	3	1,44%
SAN ROQUE	3	1,44%
URABÁ	61	29,33%
SAN PEDRO DE URABA	26	12,50%
NECOCLI	10	4,81%
TURBO	10	4,81%
SAN JUAN DE URABA	5	2,40%
APARTADO	4	1,92%
ARBOLETES	2	0,96%
CAREPA	1	0,48%
CHIGORODO	1	0,48%
MURINDO	1	0,48%
MUTATA	1	0,48%
BAJO CAUCA	23	11,06%
EL BAGRE	6	2,88%
TARAZA	5	2,40%
NECHI	4	1,92%
ZARAGOZA	4	1,92%
CACERES	3	1,44%
CAUCASIA	1	0,48%
ORIENTE	22	10,58%
SONSON	7	3,37%
SAN LUIS	4	1,92%
SAN FRANCISCO	3	1,44%
ABEJORRAL	2	0,96%
ARGELIA	2	0,96%
SAN CARLOS	2	0,96%
COCORNA	1	0,48%
SAN RAFAEL	1	0,48%
NORTE	15	7,21%
VALDIVIA	12	5,77%
ANGOSTURA	1	0,48%
BRICENO	1	0,48%
ITUANGO	1	0,48%
MAGDALENA MEDIO	8	3,85%
MACEO	3	1,44%
YONDO (CASABE)	3	1,44%
CARACOLI	1	0,48%
PUERTO BERRIO	1	0,48%
OCCIDENTE	4	1,92%
BURITICA	1	0,48%
DABEIBA	1	0,48%
LIBORINA	1	0,48%
SANTAFE DE ANTIOQUIA	1	0,48%
SUROESTE	1	0,48%
URRAO	1	0,48%
VALLE DE ABURRÁ	1	0,48%
CALDAS	1	0,48%
Total	208	100,00%

Año	
LEISHMANIASIS CUTANEA	LEISHMANIASIS MUCOSA

Numero de casos por sexo y grupo edad		
Sexo	Casos	%
Hombre	157	75,5%
0-4 años	2	1,0%
5-9 años	5	2,4%
10-14 años	10	4,8%
15-19 años	20	9,6%
20-24 años	39	18,8%
25-29 años	21	10,1%
30-34 años	11	5,3%
35-39 años	10	4,8%
40-44 años	6	2,9%
45-49 años	9	4,3%
50-54 años	7	3,4%
55-59 años	6	2,9%
60 y más años	11	5,3%
Mujer	51	24,5%
0-4 años	5	2,4%
5-9 años	5	2,4%
10-14 años	4	1,9%
15-19 años	7	3,4%
20-24 años	2	1,0%
25-29 años	5	2,4%
30-34 años	5	2,4%
35-39 años	3	1,4%
40-44 años	2	1,0%
45-49 años	2	1,0%
50-54 años	6	2,9%
55-59 años	2	1,0%
60 y más años	3	1,4%
Total	208	100,0%

Incidencia de leishmaniasis cutánea por subregión en menores de 10 años. Antioquia 2023-2026. (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis cutánea en menores de 10 años				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	0,66	0,66	0,00	0,00
Urabá	10,86	6,33	6,79	1,81
Suroeste	2,13	1,42	2,13	0,71
Oriente	5,23	9,89	7,56	2,91
Occidente	18,01	20,58	3,86	0,00
Norte	18,90	20,16	7,56	2,52
Nordeste	15,96	20,21	39,36	4,26
Magdalena Medio	2,14	0,00	4,27	2,14
Bajo Cauca	0,00	1,07	3,20	0,00
Antioquia	7,61	7,99	7,61	1,58

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____ casos de leishmaniasis en menores de 10 años

Incidencia de leishmaniasis por subregión. Antioquia 2023-2026 (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis por subregión				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	11,25	11,91	13,89	0,66
Urabá	153,82	85,50	90,93	27,60
Suroeste	13,49	21,30	19,88	0,71
Oriente	53,50	94,78	100,60	12,79
Occidente	108,04	97,75	77,17	5,14
Norte	183,93	156,21	139,84	18,90
Nordeste	232,99	305,33	589,39	78,73
Magdalena Medio	72,60	89,68	96,09	17,08
Bajo Cauca	93,73	84,14	105,44	24,50
Antioquia	96,48	93,61	119,98	19,41

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____casos de leishmaniasis

Casos de leishmaniasis según ocupación. Antioquia.

Nombre ocupación	Casos	% Casos
Otros miembros de las fuerzas armadas	38	18,27%
Estudiante	37	17,79%
Hogar (ama de casa)	25	12,02%
Mineros y canteros	17	8,17%
Personas que realizan trabajos varios	17	8,17%
Agricultores de cultivos extensivos	13	6,25%
Cesante o sin ocupaci�n o desempleado	7	3,37%
No aplica	7	3,37%
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros ep�grafes	7	3,37%
Otros oficiales, operarios y oficios	6	2,88%
Trabajadores forestales	6	2,88%
Agricultores de huertas, invernaderos, viveros y jardines	3	1,44%
Guardias de protecci�n	2	0,96%
Menor de edad	2	0,96%
Oficiales de las fuerzas militares	2	0,96%
Pensionado	2	0,96%
Agricultores de cultivos permanentes (plantaciones de arboles y arbustos)	1	0,48%
Ayudantes electricistas	1	0,48%
Conductores de camionetas y v�h�culos livianos	1	0,48%
Creadores y analistas de sistemas informaticos	1	0,48%
Electrot�cnicos	1	0,48%
Operadores de maquinas de movimiento de tierras, construccion v�as y afines	1	0,48%
Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines	1	0,48%
Patrulleros y agentes de polic�a	1	0,48%
Pegadores cargas explosivas	1	0,48%
Profesores de ense�anza secundaria	1	0,48%
Supervisores administrativos	1	0,48%
Supervisores de almacenamiento, inventario y distribuci�n	1	0,48%
Trabajadores agr�colas de subsistencia	1	0,48%
Trabajadores agropecuarios de subsistencia	1	0,48%
Trabajadores calificados de riego agr�cola	1	0,48%
Vendedor de tienda	1	0,48%
Veterinarios	1	0,48%
Total	208	100,00%

¡Advertencia! Los datos del año 2025 son preliminares y pueden variar por ajustes de notificación

Fecha última actualización:

jueves, 14 de mayo de 2026

Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



Año

Semana

Subregión

Municipio

Tipo Leishmaniasis




2026

Todas




Todas

Todas

L. Mucosa



Pertenencia Étnica		
Pertenencia Étnica	Casos	%
Otro	1	100,00%
Total	1	100,00%



Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



Año

2023202420252026

Año

LEISHMANIASIS CUTANEALEISHMANIASIS MUCOSA

Número de Casos Según subregión y municipio procedencia		
subregion	Total casos	%
NORDESTE	1	100,00%
ANORI	1	100,00%
Total	1	100,00%

Numero de casos por sexo y grupo edad		
Sexo	Casos	%
Hombre	1	100,0%
25-29 años	1	100,0%
Total	1	100,0%

Incidencia de leishmaniasis cutánea por subregión en menores de 10 años. Antioquia 2023-2026. (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis cutánea en menores de 10 años				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	0,66	0,66	0,00	0,00
Urabá	10,86	6,33	6,79	1,81
Suroeste	2,13	1,42	2,13	0,71
Oriente	5,23	9,89	7,56	2,91
Occidente	18,01	20,58	3,86	0,00
Norte	18,90	20,16	7,56	2,52
Nordeste	15,96	20,21	39,36	4,26
Magdalena Medio	2,14	0,00	4,27	2,14
Bajo Cauca	0,00	1,07	3,20	0,00
Antioquia	7,61	7,99	7,61	1,58

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____ casos de leishmaniasis en menores de 10 años

Incidencia de leishmaniasis por subregión. Antioquia 2023-2026 (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis por subregión				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	11,25	11,91	13,89	0,66
Urabá	153,82	85,50	90,93	27,60
Suroeste	13,49	21,30	19,88	0,71
Oriente	53,50	94,78	100,60	12,79
Occidente	108,04	97,75	77,17	5,14
Norte	183,93	156,21	139,84	18,90
Nordeste	232,99	305,33	589,39	78,73
Magdalena Medio	72,60	89,68	96,09	17,08
Bajo Cauca	93,73	84,14	105,44	24,50
Antioquia	96,48	93,61	119,98	19,41

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____casos de leishmaniasis

Casos de leishmaniasis según ocupación. Antioquia.

Nombre ocupación	Casos	% Casos
Otros miembros de las fuerzas armadas	1	100,00%
Total	1	100,00%