

Fecha última actualización:
sábado, 30 de mayo
de 2026

Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



Año

2026

Semana

Todas

Subregión






Todas

Municipio




Todas

Tipo Leishmaniasis

Todas



Pertenencia Étnica		
Pertenencia Étnica	Casos	%
Otro	252	94,03%
Negro, mulato afro colombiano	12	4,48%
Indígena	4	1,49%
Total	268	100,00%



Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



Año			
2023	2024	2025	2026

Número de Casos Según subregión y municipio procedencia		
subregion	Total casos	%
☐ NORDESTE	87	32,46%
ANORI	29	10,82%
REMEDIOS	24	8,96%
SEGOVIA	21	7,84%
VEGACHI	6	2,24%
SAN ROQUE	4	1,49%
AMALFI	3	1,12%
☐ URABÁ	80	29,85%
SAN PEDRO DE URABA	33	12,31%
NECOCLI	16	5,97%
TURBO	14	5,22%
APARTADO	5	1,87%
SAN JUAN DE URABA	5	1,87%
ARBOLETES	3	1,12%
CAREPA	1	0,37%
CHIGORODO	1	0,37%
MURINDO	1	0,37%
MUTATA	1	0,37%
☐ ORIENTE	33	12,31%
SAN LUIS	12	4,48%
SONSON	7	2,61%
SAN FRANCISCO	4	1,49%
SAN CARLOS	3	1,12%
ABEJORRAL	2	0,75%
ARGELIA	2	0,75%
SAN RAFAEL	2	0,75%
COCORNA	1	0,37%
☐ BAJO CAUCA	30	11,19%
EL BAGRE	8	2,99%
TARAZA	8	2,99%
NECHI	5	1,87%
ZARAGOZA	4	1,49%
CACERES	3	1,12%
CAUCASIA	2	0,75%
☐ NORTE	19	7,09%
VALDIVIA	16	5,97%
ANGOSTURA	1	0,37%
BRICENO	1	0,37%
ITUANGO	1	0,37%
☐ MAGDALENA MEDIO	10	3,73%
MACEO	4	1,49%
YONDO (CASABE)	3	1,12%
CARACOLI	1	0,37%
PUERTO BERRIO	1	0,37%
PUERTO TRIUNFO	1	0,37%
☐ OCCIDENTE	6	2,24%
DABEIBA	2	0,75%
BURITICA	1	0,37%
FRONTINO	1	0,37%
LIBORINA	1	0,37%
SANTAFE DE ANTIOQUIA	1	0,37%
☐ SUROESTE	2	0,75%
AMAGA	1	0,37%
URRAO	1	0,37%
☐ VALLE DE ABURRÁ	1	0,37%
CALDAS	1	0,37%
Total	268	100,00%

Año	
LEISHMANIASIS CUTANEA	LEISHMANIASIS MUCOSA

Numero de casos por sexo y grupo edad		
Sexo	Casos	%
☐ Hombre	200	74,6%
0-4 años	4	1,5%
5-9 años	5	1,9%
10-14 años	11	4,1%
15-19 años	25	9,3%
20-24 años	47	17,5%
25-29 años	27	10,1%
30-34 años	14	5,2%
35-39 años	12	4,5%
40-44 años	11	4,1%
45-49 años	13	4,9%
50-54 años	9	3,4%
55-59 años	7	2,6%
60 y más años	15	5,6%
☐ Mujer	68	25,4%
0-4 años	5	1,9%
5-9 años	5	1,9%
10-14 años	4	1,5%
15-19 años	7	2,6%
20-24 años	2	0,7%
25-29 años	7	2,6%
30-34 años	8	3,0%
35-39 años	6	2,2%
40-44 años	4	1,5%
45-49 años	2	0,7%
50-54 años	6	2,2%
55-59 años	2	0,7%
60 y más años	10	3,7%
Total	268	100,0%

Incidencia de leishmaniasis cutánea por subregión en menores de 10 años. Antioquia 2023-2026. (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis cutánea en menores de 10 años				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	0,66	0,66	0,00	0,00
Urabá	10,86	6,33	6,79	1,81
Suroeste	2,13	1,42	2,13	0,71
Oriente	5,23	9,89	7,56	3,49
Occidente	18,01	20,58	3,86	0,00
Norte	18,90	20,16	7,56	2,52
Nordeste	15,96	20,21	39,36	4,26
Magdalena	2,14	0,00	4,27	2,14
Medio				
Bajo Cauca	0,00	1,07	3,20	1,07
Antioquia	7,61	7,99	7,61	1,76

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____ casos de leishmaniasis en menores de 10 años

Incidencia de leishmaniasis por subregión. Antioquia 2023-2026 (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis por subregión				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	11,25	11,91	13,89	0,66
Urabá	153,82	85,50	90,93	36,19
Suroeste	13,49	21,30	19,88	1,42
Oriente	53,50	94,78	100,60	19,19
Occidente	108,04	97,75	77,17	7,72
Norte	183,93	156,21	139,84	23,94
Nordeste	232,99	305,33	589,39	92,56
Magdalena Medio	72,60	89,68	96,09	21,35
Bajo Cauca	93,73	84,14	105,44	31,95
Antioquia	96,48	93,61	119,98	24,89

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____casos de leishmaniasis

Casos de leishmaniasis según ocupación. Antioquia.

Nombre ocupación	Casos	% Casos
Otros miembros de las fuerzas armadas	41	15,30%
Estudiante	40	14,93%
Hogar (ama de casa)	38	14,18%
Personas que realizan trabajos varios	29	10,82%
Mineros y canteros	24	8,96%
Agricultores de cultivos extensivos	18	6,72%
No aplica	12	4,48%
Cesante o sin ocupaci�n o desempleado	8	2,99%
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros ep�grafes	8	2,99%
Trabajadores forestales	8	2,99%
Otros oficiales, operarios y oficios	6	2,24%
Agricultores de huertas, invernaderos, viveros y jardines	3	1,12%
Menor de edad	3	1,12%
Guardias de protecci�n	2	0,75%
Oficiales de las fuerzas militares	2	0,75%
Operadores de maquinas de movimiento de tierras, construccion vias y afines	2	0,75%
Pensionado	2	0,75%
Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros ep�grafes	1	0,37%
Agricultores de cultivos permanentes (plantaciones de arboles y arbustos)	1	0,37%
Ayudantes electricistas	1	0,37%
Conductores de camionetas y v�h�culos livianos	1	0,37%
Coordinadores de sistemas integrados de gesti�n	1	0,37%
Coordinadores y supervisores de ventas y comercializacion	1	0,37%
Creadores y analistas de sistemas informaticos	1	0,37%
Electrotecnicos	1	0,37%
Manicuristas y pedicuristas	1	0,37%
Mozos de labranza y peones agropecuarios	1	0,37%
Nineras y cuidadoras infantiles	1	0,37%
Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines	1	0,37%
Patrulleros y agentes de polic�a	1	0,37%
Pegadores cargas explosivas	1	0,37%
Profesores de ense�anza secundaria	1	0,37%
Supervisores administrativos	1	0,37%
Total	268	100,00%

Fecha última actualización:
sábado, 30 de mayo
de 2026

Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



Año

2026

Semana

Todas

Subregión






Todas

Municipio




Todas

Tipo Leishmaniasis

L. Cutánea



Pertenencia Étnica		
Pertenencia Étnica	Casos	%
Otro	251	94,01%
Negro, mulato afro colombiano	12	4,49%
Indígena	4	1,50%
Total	267	100,00%



Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



Año			
2023	2024	2025	2026

Número de Casos Según subregión y municipio procedencia		
subregion	Total casos	%
☐ NORDESTE	86	32,21%
ANORI	28	10,49%
REMEDIOS	24	8,99%
SEGOVIA	21	7,87%
VEGACHI	6	2,25%
SAN ROQUE	4	1,50%
AMALFI	3	1,12%
☐ URABÁ	80	29,96%
SAN PEDRO DE URABA	33	12,36%
NECOCLI	16	5,99%
TURBO	14	5,24%
APARTADO	5	1,87%
SAN JUAN DE URABA	5	1,87%
ARBOLETES	3	1,12%
CAREPA	1	0,37%
CHIGORODO	1	0,37%
MURINDO	1	0,37%
MUTATA	1	0,37%
☐ ORIENTE	33	12,36%
SAN LUIS	12	4,49%
SONSON	7	2,62%
SAN FRANCISCO	4	1,50%
SAN CARLOS	3	1,12%
ABEJORRAL	2	0,75%
ARGELIA	2	0,75%
SAN RAFAEL	2	0,75%
COCORNA	1	0,37%
☐ BAJO CAUCA	30	11,24%
EL BAGRE	8	3,00%
TARAZA	8	3,00%
NECHI	5	1,87%
ZARAGOZA	4	1,50%
CACERES	3	1,12%
CAUCASIA	2	0,75%
☐ NORTE	19	7,12%
VALDIVIA	16	5,99%
ANGOSTURA	1	0,37%
BRICENO	1	0,37%
ITUANGO	1	0,37%
☐ MAGDALENA MEDIO	10	3,75%
MACEO	4	1,50%
YONDO (CASABE)	3	1,12%
CARACOLI	1	0,37%
PUERTO BERRIO	1	0,37%
PUERTO TRIUNFO	1	0,37%
☐ OCCIDENTE	6	2,25%
DABEIBA	2	0,75%
BURITICA	1	0,37%
FRONTINO	1	0,37%
LIBORINA	1	0,37%
SANTAFE DE ANTIOQUIA	1	0,37%
☐ SUROESTE	2	0,75%
AMAGA	1	0,37%
URRAO	1	0,37%
☐ VALLE DE ABURRÁ	1	0,37%
CALDAS	1	0,37%
Total	267	100,00%

Año	
LEISHMANIASIS CUTANEA	LEISHMANIASIS MUCOSA

Numero de casos por sexo y grupo edad		
Sexo	Casos	%
☐ Hombre	199	74,5%
0-4 años	4	1,5%
5-9 años	5	1,9%
10-14 años	11	4,1%
15-19 años	25	9,4%
20-24 años	47	17,6%
25-29 años	26	9,7%
30-34 años	14	5,2%
35-39 años	12	4,5%
40-44 años	11	4,1%
45-49 años	13	4,9%
50-54 años	9	3,4%
55-59 años	7	2,6%
60 y más años	15	5,6%
☐ Mujer	68	25,5%
0-4 años	5	1,9%
5-9 años	5	1,9%
10-14 años	4	1,5%
15-19 años	7	2,6%
20-24 años	2	0,7%
25-29 años	7	2,6%
30-34 años	8	3,0%
35-39 años	6	2,2%
40-44 años	4	1,5%
45-49 años	2	0,7%
50-54 años	6	2,2%
55-59 años	2	0,7%
60 y más años	10	3,7%
Total	267	100,0%

Incidencia de leishmaniasis cutánea por subregión en menores de 10 años. Antioquia 2023-2026. (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis cutánea en menores de 10 años				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	0,66	0,66	0,00	0,00
Urabá	10,86	6,33	6,79	1,81
Suroeste	2,13	1,42	2,13	0,71
Oriente	5,23	9,89	7,56	3,49
Occidente	18,01	20,58	3,86	0,00
Norte	18,90	20,16	7,56	2,52
Nordeste	15,96	20,21	39,36	4,26
Magdalena	2,14	0,00	4,27	2,14
Medio				
Bajo Cauca	0,00	1,07	3,20	1,07
Antioquia	7,61	7,99	7,61	1,76

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____ casos de leishmaniasis en menores de 10 años

Incidencia de leishmaniasis por subregión. Antioquia 2023-2026 (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis por subregión				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	11,25	11,91	13,89	0,66
Urabá	153,82	85,50	90,93	36,19
Suroeste	13,49	21,30	19,88	1,42
Oriente	53,50	94,78	100,60	19,19
Occidente	108,04	97,75	77,17	7,72
Norte	183,93	156,21	139,84	23,94
Nordeste	232,99	305,33	589,39	92,56
Magdalena Medio	72,60	89,68	96,09	21,35
Bajo Cauca	93,73	84,14	105,44	31,95
Antioquia	96,48	93,61	119,98	24,89

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____ casos de leishmaniasis

Casos de leishmaniasis según ocupación. Antioquia.

Nombre ocupación	Casos	% Casos
Estudiante	40	14,98%
Otros miembros de las fuerzas armadas	40	14,98%
Hogar (ama de casa)	38	14,23%
Personas que realizan trabajos varios	29	10,86%
Mineros y canteros	24	8,99%
Agricultores de cultivos extensivos	18	6,74%
No aplica	12	4,49%
Cesante o sin ocupación o desempleado	8	3,00%
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes	8	3,00%
Trabajadores forestales	8	3,00%
Otros oficiales, operarios y oficios	6	2,25%
Agricultores de huertas, invernaderos, viveros y jardines	3	1,12%
Menor de edad	3	1,12%
Guardias de protección	2	0,75%
Oficiales de las fuerzas militares	2	0,75%
Operadores de maquinas de movimiento de tierras, construccion vias y afines	2	0,75%
Pensionado	2	0,75%
Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes	1	0,37%
Agricultores de cultivos permanentes (plantaciones de arboles y arbustos)	1	0,37%
Ayudantes electricistas	1	0,37%
Conductores de camionetas y vehículos livianos	1	0,37%
Coordinadores de sistemas integrados de gestión	1	0,37%
Coordinadores y supervisores de ventas y comercializacion	1	0,37%
Creadores y analistas de sistemas informaticos	1	0,37%
Electrotecnicos	1	0,37%
Manicuristas y pedicuristas	1	0,37%
Mozos de labranza y peones agropecuarios	1	0,37%
Nineras y cuidadoras infantiles	1	0,37%
Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines	1	0,37%
Patrulleros y agentes de policía	1	0,37%
Pegadores cargas explosivas	1	0,37%
Profesores de enseñanza secundaria	1	0,37%
Supervisores administrativos	1	0,37%
Total	267	100,00%

¡Advertencia! Los datos del año 2025 son preliminares y pueden variar por ajustes de notificación

Fecha última actualización:

sábado, 30 de mayo de 2026

Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



Año

Semana

Subregión

Municipio

Tipo Leishmaniasis



2026

Todas




Todas

Todas

L. Mucosa



Pertenencia Étnica		
Pertenencia Étnica	Casos	%
Otro	1	100,00%
Total	1	100,00%



Comportamiento Epidemiológico de la Leishmaniasis (Cutánea, Mucosa y Visceral) en el departamento de Antioquia



Año			
2023	2024	2025	2026

Año	
LEISHMANIASIS CUTANEA	LEISHMANIASIS MUCOSA

Número de Casos Según subregión y municipio procedencia		
subregion	Total casos	%
NORDESTE	1	100,00%
ANORI	1	100,00%
Total	1	100,00%

Numero de casos por sexo y grupo edad		
Sexo	Casos	%
Hombre	1	100,0%
25-29 años	1	100,0%
Total	1	100,0%

Incidencia de leishmaniasis cutánea por subregión en menores de 10 años. Antioquia 2023-2026. (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis cutánea en menores de 10 años				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	0,66	0,66	0,00	0,00
Urabá	10,86	6,33	6,79	1,81
Suroeste	2,13	1,42	2,13	0,71
Oriente	5,23	9,89	7,56	3,49
Occidente	18,01	20,58	3,86	0,00
Norte	18,90	20,16	7,56	2,52
Nordeste	15,96	20,21	39,36	4,26
Magdalena Medio	2,14	0,00	4,27	2,14
Bajo Cauca	0,00	1,07	3,20	1,07
Antioquia	7,61	7,99	7,61	1,76

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____ casos de leishmaniasis en menores de 10 años

Incidencia de leishmaniasis por subregión. Antioquia 2023-2026 (Población a riesgo año 2023).

Incidencia de leishmaniasis por subregión				
Subregión	2023	2024	2025	2026
Valle de Aburrá	11,25	11,91	13,89	0,66
Urabá	153,82	85,50	90,93	36,19
Suroeste	13,49	21,30	19,88	1,42
Oriente	53,50	94,78	100,60	19,19
Occidente	108,04	97,75	77,17	7,72
Norte	183,93	156,21	139,84	23,94
Nordeste	232,99	305,33	589,39	92,56
Magdalena Medio	72,60	89,68	96,09	21,35
Bajo Cauca	93,73	84,14	105,44	31,95
Antioquia	96,48	93,61	119,98	24,89

Interpretación del resultado:
Por cada 100.000 habitantes a riesgo, se presentaron ____casos de leishmaniasis

Casos de leishmaniasis según ocupación. Antioquia.

Nombre ocupación	Casos	% Casos
Otros miembros de las fuerzas armadas	1	100,00%
Total	1	100,00%