

Fecha última actualización:

9/04/2025



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 14 .

Año 2025 Período Todas Semana Todas Municipio Todas Subregión Todas

Limpiar Filtros

Desnutrición

Indicadores

Casos

980



Prevalencia Total

0,24



Urbana

777

79,29 %




Rural

203

20,71 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

412

%

42,0



Niños

568

%

58,0

Promedio Edad en Meses

26,5

N° de casos por sexo y grupo de edad






Tabla de Frecuencia de la Pertenencia Étnica

Pertenencia Étnica	N° de Casos	%
Otro	907	92,55%
Indígena	37	3,78%
Negro, mulato afro colombiano	34	3,47%
Raizal	2	0,20%
Total	980	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Casos de desnutrición por EAPB

Aseguradora	Contributivo	Excepción	Indeterminado/ pendiente	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	15				347	362
SURA EPS	186				61	247
NUEVA EPS	77				31	108
COOSALUD ESS EPS-S					78	78
SALUD TOTAL	54					54
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO					52	52
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO					23	23
SIN ASEGURAMIENTO			4	12		16
SANITAS EPS	13				2	15
COMFASUCRE					6	6
FIDUPREVISORA SA RES		4				4
FUERZAS MILITARES		4				4
AIC EPSI					3	3
COOSALUD	3					3
ASMET SALUD ESS					1	1
CAPITAL SALUD EPS					1	1
COMPENSAR EPS	1					1
FAMISANAR EPS LTDA	1					1
MUTUAL SER EPS					1	1
Total	350	8	4	12	606	980



(Advertencia) Los datos aquí presentados son preliminares y pueden variar por ajustes de notificación



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 14.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo

78 %



Mediana edad gestantes al nacer

38

Semanas



Promedio tiempo leche materna

10

Meses



Mediana Peso al Nacer

2,654

grms



Prom Ini. Alim Completa

5,52

Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*

21 %

Reincidentes

Casos

365

Porcentaje de reincidentes

37,2 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLÍN	166
BELLO	23
TURBO	17
APARTADO	11
NECOCLÍ	10
CAREPA	9
CARMEN DE VIBORAL	7
ITAGUI	7
MARINILLA	7
SONSON	6
URRAO	6
CAUCASIA	5
SEGOVIA	5
AMALFI	4
BRICEÑO	4
CHIGORODO	3
Total	365

Prevalencia por municipio de residencia

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
MURINDO	0.91
MACEO	0.57
GUATAPE	0.44
OLAYA	0.55
ANZA	0.52
BRICEÑO	0.51
DISNEROS	0.51
URRAO	0.46
MECOCLÍ	0.44
SONSON	0.44
SAN ANDRÉS	0.44
OLAYA	0.43
VENECIA	0.40
CARAMANTA	0.39
SAN PEDRO	0.38
CAREPA	0.37
HELICONIA	0.36
AMALFI	0.35
CIUDAD BOLÍVAR	0.35
MUTATA	0.34
CAUCASIA	0.34
YALI	0.34
ARGELIA	0.32
TURBO	0.31
GRANADA	0.31
SAN ROQUE	0.31
MEDELLÍN	0.30
SAN JUAN DE URABÁ	0.30
CARMEN DE VIBORAL	0.28
MARINILLA	0.27
LA UNIÓN	0.27
SETANIA	0.27
ANGELOPOLIS	0.27
FRONTINO	0.27
BARBOSA	0.27
TARSO	0.26
SEGOVIA	0.26
MONTEBELLO	0.25
SANTUARIO	0.25
SAN CARLOS	0.25
APARTADO	0.24
DABEIBA	0.24
PRONOSGRO	0.24
GIRARDOTA	0.23
SALGAR	0.23
VEGACHI	0.23
ANGOSTURA	0.22
BELMIRA	0.22
TOLEDO	0.22
ANDÉS	0.21
CHIGORODO	0.20
PENOL	0.20
LA PINTADA	0.20
NECAH	0.20
YOLCOMBO	0.19

Priorización

Priorización	CASOS
Muy urgentes indígenas	5
Muy urgentes no indígenas	84
regular	649
Super urgentes indígenas	20
Super urgentes no indígenas	272

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Norte	26	0.144
Occidente	27	0.156
Bajo Cauca	49	0.154
Magdalena Medio	16	0.187
Surcoeste	43	0.188
Nordeste	35	0.219
Oriente	102	0.226
Valle de Aburrá	533	0.254
Uraba	149	0.292


Activación ruta

82,9 %


No activación de la ruta

17,0 %


Clasificación



Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, periodo epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

CANAL ENDÉMICO 2018 - 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
1	29	19	↓ DECREMENTO
2	25	37	↑ ESTABLE
3	32	50	↑ INCREMENTO
4	33	63	↑ INCREMENTO
5	36	84	↑ INCREMENTO
6	29	80	↑ INCREMENTO
7	47	83	↑ INCREMENTO
8	42	89	↑ ESTABLE
9	45	90	↑ INCREMENTO
10	33	74	↑ INCREMENTO
11	43	99	↑ INCREMENTO
12	33	82	↑ INCREMENTO
13	28	67	↑ INCREMENTO
14	25	63	↑ INCREMENTO

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SMVILA- a semana 14 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SMVILA entre los años 2016 a 2025 hasta semana epidemiológica 14.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMHVR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2016 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SMVILA.