





Nutrición

Desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años



1911

Número de casos


Comportamiento epidemiológico del evento




Información sociodemográfica del evento




Mapa de calor prevalencia por municipio de residencia



Fuente: Sivigila, 2026, Cod. Evento 113



Indicadores del evento



Reincidencia desnutrición aguda, Antioquia a SE 36

Proporción de reincidentes respecto al total de casos notificados al evento

Antioquia

2026	Casos reincidentes: 558	Porcentaje: 29,20 %
2025	Casos: 630	Porcentaje de reincidentes: 30,9 %

MUNICIPIO DE RESIDENCIA	REINCIDENCIA 2026	REINCIDENCIA 2025
BETANIA	100%	100%
CARACOLÍ	100%	100%
ENTRERRÍOS	100%	20%
GOMEZ PLATA	100%	71%
MONTEBELLO	100%	0%
YALÍ	75%	50%
COCORNA	67%	20%
PENOL	63%	45%
YOLOMBO	57%	33%
BELMIRA	50%	100%
CAMPAMENTO	50%	0%
CARAMANTA	50%	0%
PEQUE	50%	100%
RETIRO	50%	33%
SALGAR	50%	57%
TARAZA	50%	33%
TOLEDO	50%	33%
CAREPA	47%	53%
VEGACHI	46%	40%
PUERTO NARE	43%	50%

Indicadores críticos



Promedio semana de gestación al nacer

37,52

Promedio peso al nacer en gramos

2.690

Crecimiento y Desarrollo

70,80 %



Promedio tiempo en meses de lactancia materna

9,13

Promedio edad en meses de inicio alimentación complementaria

5,59

Porcentaje con perímetro braquial menor a 11,5 cm

3,22 %

Ficha técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica – SIVIGILA– a **Semana 36 de 2026** . Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población **DANE 2026**.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2016 a **2026** hasta **Semana 36**.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 60 registros notificados y se uso la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que esperado y lo observado, con un valor de significancia de .menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2021 al 2025 y lo notificado en el **2026**.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.